



Aide-mémoire: intubation à séquence rapide à l'urgence



(Exemples de poids usuels)



		60 KG 	80 KG 
PRÉTRAITEMENT (dose en mcg)			
Fentanyl	2 mcg/kg	120	160
	3 mcg/kg	180	240
INDUCTION (dose en mg)			
Midazolam	0,2 mg/kg	12	16
	0,3 mg/kg	18	24
Kétamine	1,5 mg/kg	90	120
	2 mg/kg	120	160
Étomidate	0,3 mg/kg	18	24
Propofol	1 mg/kg	60	80
	1,5 mg/kg	90	120
	2 mg/kg	120	160
CURARISATION (dose en mg)			
Succinylcholine	1,5 mg/kg	90	120
Rocuronium	1 mg/kg	60	80



Analgésie/sédation post-intubation à l'urgence



Sédation	Analgésie	Hypotension
Midazolam 1 mg/ml Débit initial: 2 mg/h	Morphine 1 mg/ml Débit initial: 2 mg/h	Phényléphrine IV 100 mcg/ml 10 mg dans 100 ml de NS 0.9, concentration 100 ug/ml, 50-100 ug aux 1-5 min
Propofol 10 mg/ml Débit initial: 10 ug/kg/min	Fentanyl 50 mcg/ml Débit initial: 10 ug/kg/min	Éphédrine IV 5 mg/ml 50 mg dans 10 ml de NS 0.9, concentration de 5 mg/ml, 5-25 aux 5-10 min